

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ**

31 мая 2006 г. № 38

**Медицинские показания и медицинские противопоказания для санаторно-курортного лечения пациентов (взрослые)**

№ п/п	Код по МКБ-10	Медицинские показания	Медицинские противопоказания	Профиль санатория
<b>БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ</b>				
1.	J 18.9	Пневмония неуточненная Хроническая пневмония в фазе стойкой и нестойкой ремиссии при наличии легочно-сердечной недостаточности не выше I стадии (при нестойкой ремиссии, частых обострениях – в теплое время года)	Все заболевания дыхательной системы, сопровождающиеся развитием легочно-сердечной недостаточности выше II стадии Бронхиальная астма с частыми и (или) тяжелыми приступами удушья, гормонозависимая неконтролируемая астма Бронхоэктатическая болезнь и хронический абсцесс при резком истощении пациентов, повышении температуры тела, выделении обильной гнойной мокроты Состояние после неэффективных оперативных вмешательств, наличие послеоперационных осложнений Кровохарканье Плевральный выпот Заболевания респираторной системы воспалительного генеза в острый период и в фазе обострения хронического процесса	Санатории (отделения) пульмонологического профиля
2.	J 41.8	Бронхит смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический Хронический бронхит простой, слизисто-гнойный, трахеобронхит неспецифического, профессионального характера (токсической и пылевой этиологии) и вызванный радиационным излучением в фазе стойкой и нестойкой ремиссии		
3.	J 43	Эмфизема Эмфизема легких, в том числе при наличии легочно-сердечной недостаточности не выше I стадии		
4.	J 44	Другая хроническая обструктивная легочная болезнь Хронический катаральный обструктивный бронхит неспецифического, радиационного и профессионального характера в фазе стойкой и нестойкой ремиссии; хронический гнойно-обструктивный бронхит в фазе стойкой ремиссии, с легочно-сердечной недостаточностью не выше I стадии		
5.	J 45	Астма Бронхиальная астма атопическая (экзогенная, иммунологическая), неатопическая (эндогенная, неиммунологическая), смешанная, в том числе профессионального		

		происхождения в фазе ремиссии с легкими и нечастыми приступами удушья, с дыхательной недостаточностью не выше II степени (в теплое время года) Бронхиальная астма в фазе нестойкой ремиссии, гормонозависимая контролируемая, с наличием легочно-сердечной недостаточности не выше I стадии (местные санатории (отделения))		
6.	J 47	Бронхоэктатическая болезнь Бронхоэктатическая болезнь в фазе ремиссии, с ограниченными инфильтративными изменениями, без выделения обильной гнойной мокроты, без кровохарканья, при наличии легочно-сердечной недостаточности не выше I стадии		
7.	J 95.3	Хроническая легочная недостаточность вследствие операции Состояние после эффективных оперативных вмешательств по поводу нагноительных процессов неспецифического характера, врожденной патологии, доброкачественных новообразований в бронхолегочной системе при окрепшем послеоперационном рубце, неосложненном течении послеоперационного периода, наличии легочно-сердечной недостаточности не выше I стадии через 6 месяцев после операции; то же через 1–4 месяца после операции (местные санатории (отделения))		
<b>БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ</b>				
8.	M 05	Серопозитивный ревматоидный артрит Серопозитивный ревматоидный артрит, медленно прогрессирующее течение, в фазе ремиссии или активности процесса не выше II степени, утрата функциональной способности не выше II степени	Тяжелые формы поражения костей и суставов с обильным отделяемым, тяжелыми общими явлениями (высокая температура, резкое истощение) или амилоидозом внутренних органов Полиартриты с прогрессирующим процессом в суставах, с анкилозами, контрактурами и т.п. при необратимых изменениях в суставах и при потере способности к самообслуживанию	
		Примечание. Возможно направление на санаторно-курортное лечение пациентов, находящихся на	Тяжелые деформации суставов с вторичным синовитом при потере возможности самостоятельного	

		постоянной гормональной терапии или после ее отмены, через 2 месяца	передвижения Хронические остеомиелиты при наличии крупных секвестров	
9.	М 06.0	Серонегативный ревматоидный артрит Серонегативный ревматоидный артрит, медленно прогрессирующее течение, в фазе ремиссии или активности процесса не выше II степени, функциональная недостаточность суставов I и II степени		
10.	М 07	Псориатическая артропатия Псориатический дистальный межфаланговый артрит, псориатический спондилит, активность псориатического процесса на выше II степени, псориаз в стационарной стадии		
11.	М 08.0	Юношеский ревматоидный артрит Юношеский ревматоидный артрит и анкилозирующий спондилит, в фазе ремиссии или активности процесса не выше II степени, при возможности самостоятельного передвижения пациента		
12.	М 10.0	Идиопатическая подагра Идиопатическая, первичная подагра, хронический подагрический артрит вне фазы обострения  Примечание. При поражении почек исключаются курорты с сероводородными водами		
13.	М 15	Полиартроз Полиоостеоартроз дистрофический, посттравматический на почве нарушения обмена веществ, гормональных изменений, с небольшим синовитом и без него		
14.	М 16	Коксартроз (артроз тазобедренного сустава) Первичный, диспластический, посттравматический (при условии возможности передвижения пациента)		
		Примечание. Пациенты после ортопедических операций и эндопротезирования могут направляться в местные санатории через 2 месяца, на бальнеологические курорты – через 6 месяцев		
15.	М 17	Гонартроз (артроз коленного		

		сустава) Первичный, посттравматический артроз коленного сустава без выраженного синовита при условии самостоятельного передвижения		
16.	М 19	Другие артрозы Первичные, посттравматические артрозы		
17.	М 42	Остеохондроз позвоночника с вторичными неврологическими расстройствами при условии самостоятельного передвижения		
18.	М 45	Анкилозирующий спондилит Анкилозирующий спондилит в фазе ремиссии или активности процесса не выше II степени без висцерита, при условии самостоятельного передвижения пациента – за исключением грязевых курортов и с хлоридно- натриевыми водами		
19.	М 47	Спондилез Спондилез с радикулопатией и без нее, сопровождающийся местными и отраженными синдромами, без резких ограничений подвижности позвоночника		
20.	М 86	Остеомиелит Остеомиелит хронический гематогенный (кроме туберкулезного), фистулезный с рецидивирующим течением, не требующий хирургического вмешательства или после него (при нормальной температуре), без признаков амилоидоза внутренних органов Остеомиелит хронический огнестрельный, рецидивирующий, до и после хирургического вмешательства Остеомиелит после переломов костей без секвестра Все формы, не препятствующие самостоятельному передвижению		
21.	Т 25	Последствия термических и химических ожогов Послеожоговые контрактуры, в том числе после		

		реконструктивных операций: дерматодесмогенные (возникшие при рубцовом изменении кожи, подкожной клетчатки и фасций), миогенные (образующиеся при рубцовом перерождении или рефлекторном либо вторичном сокращении мышц), сухожильные (как следствие повреждения сухожилий или сращения их с окружающими тканями), артрогенные (вследствие поражения суставов или сморщивания суставной капсулы), келоидные рубцы после ожогов и реконструктивных операций, послеожоговые язвы (в том числе после операций по поводу послеожоговых трофических язв) при условии самостоятельного передвижения и самообслуживания		
		Примечание. Пациентов после ожоговой травмы, получавших гормональную терапию, следует направлять на санаторно-курортное лечение не ранее 1–1,5 месяца после отмены гормональных лекарственных средств		
<b>БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ</b>				
Болезни центральной нервной системы				
22.	G 00–03	Менингит Церебральный арахноидит, лептоменингит в стадии ремиссии, через 3–6 месяцев от начала заболевания или оперативного вмешательства	Все указанные заболевания в остром периоде, а также в любом периоде при наличии выраженных двигательных нарушений, препятствующих самостоятельному передвижению, трофических расстройств и нарушении функции тазовых органов Паркинсонизм и другие дегенеративные заболевания, рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания нервной системы при прогредиентном течении, с двигательными и тазовыми нарушениями и деменцией Последствия травм и заболеваний спинного мозга: полный перерыв спинного мозга; травматическая кахексия; хронический остеомиелит, требующий оперативного вмешательства; выраженные нарушения функции почек, уросепсис	Санатории (отделения) неврологического профиля
23.	G 04–05	Энцефалит, миелит, энцефаломиелит Остаточные явления перенесенного энцефалита, миелита, энцефаломиелита с гипоталамическим, психовегетативным синдромом после окончания острого периода (не ранее 4 месяцев от начала заболевания), при наличии продолжающегося восстановления функций и самостоятельного передвижения		
24.	S 06	Внутричерепная травма Через 4 месяца после закрытой, 5–6 месяцев – открытой черепно-мозговой травмы, отдаленные		Болезни нервной системы, сопровождающиеся психическими расстройствами

		последствия сотрясения и контузии мозга, при астеническом, психовегетативном и диэнцефальном синдромах без выраженной внутричерепной и артериальной гипертензии, без значительных двигательных нарушений, препятствующих самостоятельному передвижению, без эпилептических приступов и психических расстройств		
25.	S 14 S 24 S 34	Травмы спинного мозга При сотрясении, повреждении спинного мозга и конского хвоста, гематомииелии с легкой формой тетра- и парапареза, без ограничения самообслуживания, нарушения контроля функции тазовых органов, через 4 месяца после травмы или нейрохирургической операции		
<b>Болезни периферической нервной системы</b>				
26.	G 54	Поражения нервных корешков и сплетений Поражение шейных, грудных, пояснично-крестцовых корешков воспалительного характера, поражение плечевого, пояснично-крестцового сплетения – в подострой стадии, в ранний восстановительный период (местные санатории (отделения))		
27.	G 55	Сдавление нервных корешков и сплетений при болезнях, классифицированных в других рубриках Задний шейный симпатический синдром, обусловленный поражением межпозвонковых дисков шейного отдела (M 50), в подострый период, с редкими гипоталамическими кризами Корешковые и рефлекторные синдромы при спондилопатиях (M 45–48) и дорсопатиях (M 50–54) различного уровня со слабо и умеренно выраженными болями Дискогенный пояснично-крестцовый радикулит со слабо или умеренно		

		выраженными болями; синдром радикулоишемии при условии самообслуживания и самостоятельного передвижения		
28.	G 56–59	Мононевропатии верхней, нижней конечности и другие мононевропатии В стадии неполной ремиссии, ранний и поздний восстановительный период при наличии легких и умеренных двигательных нарушений (местные санатории (отделения))		
29.	G 60–63	Полиневропатии Полиневропатии наследственная, воспалительная, токсическая, при болезнях обмена, эндокринных, расстройствах питания и других в стадии неполной ремиссии, в поздний восстановительный период, при хроническом течении в резидуальный период		
30.	S 14 S 24 S 34 S 44 S 54 S 64 S 74 S 84 S 94	Травмы нервных корешков и сплетений, спинномозговых нервов, плечевого пояса и верхней конечности, тазового пояса и нижней конечности Последствия травм корешков, сплетений нервных стволов, не требующих хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгии, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей (не ранее 2 месяцев после травмы или операции) при возможности самостоятельного передвижения и самообслуживания		
<b>БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ</b>				
31.	K 25 K 25.7	Язва желудка Язвенная болезнь желудка в фазе ремиссии или затухающего обострения, без двигательной недостаточности, склонности к кровотечению, пенетрации и подозрения на возможность злокачественного	Все заболевания органов пищеварения в фазе обострения Рубцовое сужение пищевода и кишок с нарушением проходимости; стриктура общего желчного протока и протока желчного пузыря	Санатории (отделения) гастроэнтерологического профиля

		перерождения		
32.	К 26	Язва двенадцатиперстной кишки Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки в фазе ремиссии, без двигательной недостаточности желудка, склонности к кровотечению, пенетрации		
33.	К 28	Гастроэюнальная язва Язва (пептическая) или эрозия в фазе ремиссии, без двигательной недостаточности желудка, склонности к кровотечению, пенетрации		
34.	К 29 К 29.3 К 29.4 К 29.5 К 29.8 К 29.9	Гастрит и дуоденит Хронический гастрит с секреторной недостаточностью Хронический поверхностный гастрит Хронический атрофический гастрит Хронический гастрит неуточненный: антральный, фундальный Хронический гастрит с сохраненной и повышенной секрецией Гастродуоденит неуточненный, вне фазы обострения		
35.	К 50 К 51 К 52	Болезнь Крона, нестриктурная форма, легкая степень Язвенный колит, легкая степень Другие неинфекционные колиты и энтериты средней степени тяжести Стадия ремиссии, не ранее 1 месяца после последнего обострения	Полип или полипоз кишечника	
36.	К 59.0	Функциональная констипация, средняя степень тяжести		
37.	К 73 К 73.8	Хронический гепатит, за исключением алкогольного, лекарственного, гранулематозного, реактивного, неспецифического, вирусного Хронический (неактивный) гепатит различной этиологии, при незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени, при общем удовлетворительном состоянии		

38.	К 81.1	Холецистит. Хронический холецистит Хронический холецистит различной этиологии, без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и при нормальной СОЭ	Желчнокаменная болезнь, сопровождающаяся приступами печеночной колики	
39.	К 86.1	Другие хронические панкреатиты Хронический панкреатит (инфекционный, повторяющийся, рецидивирующий) легкой и средней степени (кроме туберкулезного) в фазе полной ремиссии, без склонности к частым обострениям Латентная форма хронического панкреатита		
40.	К 91 К 91.1	Нарушения органов пищеварения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках Синдромы оперированного желудка Болезни оперированного желудка (после операции по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) с наличием демпинг- и гипогликемического синдрома, легкой и средней степени астенического синдрома гастрита культуры, панкреатита, гепатита, холецистита, энтероколита, колита		

**БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ**

41.	N 03	Хронический нефритический синдром Хронический гломерулонефрит без выраженных явлений недостаточности азотовыделительной функции почек, макрогематурии, высокой артериальной гипертензии (до 180 мм рт. ст.) и значительных изменений сетчатки глаза	Хронические заболевания почек (хронический гломерулонефрит, хронический пиелонефрит) с выраженными признаками хронической почечной недостаточности (компенсаторная, интермиттирующая, терминальная стадии), высокой артериальной гипертензией (превышающей 180 мм рт. ст.) Нефросклероз с выраженными симптомами хронической почечной недостаточности	Санатории (отделения) нефрологического профиля
42.	N 04	Нефротический синдром Нефротический синдром (кроме возникшего на почве туберкулеза, диабета) в фазе ремиссии при удовлетворительном функциональном состоянии почек с сохранной	Гидронефроз; киста почки (множественная, солитарная), осложненная хронической почечной недостаточностью Нефротический синдром при амилоидозе с выраженными отеками, симптомами хронической почечной недостаточности	

		азотовыделительной функцией, без анемии, выраженных отеков, высокой протеинурии и гипопроteinурии	Макроскопическая гематурия любого происхождения	
43.	N 10	Острый тубулоинтерстициальный нефрит Остаточные явления после острого пиелита, пиелонефрита (не ранее 3 месяцев после купирования острого процесса)		
44.	N 11	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит Хронический пиелит, пиелонефрит в фазе ремиссии и латентного воспалительного процесса; вторичные пиелонефриты с сохраненной азотовыделительной функцией почек и без выраженной артериальной гипертензии	Болезни органов мочеполовой системы при остром течении и хронических заболеваниях в фазе активного воспалительного процесса Сморщенный мочевой пузырь любой этиологии Мочевые свищи любой этиологии Мочекаменная болезнь при наличии камней, требующих применения хирургических методов лечения Доброкачественная гиперплазия предстательной железы II и III стадии	
45.	N 20	Мочекаменная болезнь Мочекаменная болезнь с наличием в почках и мочеточниках камней, способных к спонтанному отхождению, а также осложненная хроническим пиелонефритом в фазе ремиссии и латентного воспалительного процесса		
<b>БОЛЕЗНИ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ</b>				
46.	N 70.1	Хронический сальпингит и оофорит Хроническая стадия, период ремиссии при неизменной функции яичников	Злокачественные новообразования и подозрения на их наличие Предраковые заболевания женских половых органов Послеабортный период (до первой менструации)	Санатории (отделения) гинекологического профиля
47.	N 71.1	Хроническая воспалительная болезнь матки Хронический эндо(мио)метрит, хронический метрит Хроническая стадия, период ремиссии при неизменной функции яичников	Эрозия и эрозированный эктропион шейки матки при отсутствии условий для тщательного специального обследования с целью исключения онкопатологии Полип шейки и тела матки Дисфункциональные маточные кровотечения	
48.	N 73.6	Тазовые перитонеальные спайки у женщин Спаечный процесс в малом тазу как результат хронического сальпингоофорита и (или) оперативного вмешательства на органах женской половой системы Хроническая стадия, период ремиссии при неизменной функции яичников	Кисты и кистомы яичников Миома матки, эндометриоз, фиброзно-кистозная мастопатия, требующие оперативного лечения Пузырно-влагалищные и влагалищно-толсто/тонкокишечные свищи Состояние после операций по поводу злокачественных новообразований женских половых органов	

49.	N 95.1	Менопауза и климактерическое состояние у женщин Климактерический синдром	Примечание. Вопрос о возможности направления пациентов, перенесших операции по поводу злокачественных новообразований женских половых органов, в местные санатории (при условии стабильности основных показателей онкопроцесса) решается консультативно с врачом-онкологом	
50.	N 95.3	Состояния, связанные с искусственной менопаузой Посткастрационный синдром как следствие оперативного лечения доброкачественных новообразований женской половой сферы		
51.	N 97.1	Женское бесплодие трубного происхождения Женское бесплодие тубоперитонеального генеза: непроходимость маточных труб вследствие хронического сальпингоофорита:  при неизменной функции яичников при наличии гипострогении при наличии гиперэстрогении		

#### БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ

52.	L 40.9	Псориаз, регрессирующая и стационарная стадия заболевания	Болезни кожи в острой и подострой стадиях Все заболевания кожи, не указанные в показаниях Все заразные заболевания кожи Псориаз в прогрессирующей стадии Необратимые костно-суставные и сухожильные изменения опорно-двигательного аппарата, вызванные тяжелой ожоговой травмой Длительно незаживающие ожоговые раны, требующие оперативного лечения	Санатории (отделения) дерматологического профиля
53.	L 40 M 07	Псориатические артропатии		
54.	L 20	Атопический дерматит		
55.	L 28.0	Нейродермит (локализованный, диффузный)		
56.	L 90.0	Красный плоский лишай		
57.	L 94	Другие локализованные изменения соединительной ткани Склеродермия (кроме системных форм)		
58.	L 85	Другие эпидермальные утолщения, ихтиоз, кератоз (кератодермия), кроме грибковых поражений		
		Примечание. Пациентов, страдающих ихтиозом и зимней формой псориаза, следует направлять на бальнеогрязевой курорт в летнее время		

#### БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

59.	I 05	Ревматические болезни митрального клапана	Ревматический миокардит Миокардиты типа Абрамова-Фидлера и близкие к нему по тяжести Недостаточность кровообращения выше II А Угрожающие жизни нарушения	Санатории (отделения) кардиологического профиля
60.	I 06	Ревматические болезни аортального клапана		
61.	I 41	Миокардит при		

		<p>бактериальных вирусных болезнях</p> <p>Состояние после перенесенного инфекционно-аллергического миокардита при недостаточности кровообращения II А стадии по окончании острых и подострых явлений и при отсутствии прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма</p>	<p>сердечного ритма в виде политопной частой (10–15 в минуту и более) групповой и ранней экстрасистолии, частые пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, подтвержденные документально, полная атриовентрикулярная блокада II и III степени, слабость синусового узла с редкой бради- и тахикардией</p> <p>Перенесенный инфаркт миокарда или инсульт (до 6 месяцев от начала заболевания)</p>	
62.	I 20–25	<p>Ишемическая болезнь сердца</p> <p>Стенокардия, стабильное течение, не выше ФК II</p> <p>Гипертензивная (гипертоническая) болезнь</p> <p>Гипертензивная (гипертоническая) болезнь, стабильное течение.</p> <p>Артериальная гипертензия не выше II стадии</p>	<p>Атеросклероз сосудов нижней конечности с декомпенсацией периферического кровообращения, наличие язв и гангрены</p> <p>Облитерирующий тромбангит (эндартериит) с склонностью к генерализации</p> <p>Тромбоэмболическая болезнь</p> <p>Атеросклеротическая энцефалопатия с нарушенной психической адаптацией к окружающей обстановке</p>	
63.	I 73.1	<p>Облитерирующий тромбангит (болезнь Бюргера), эндартериит</p> <p>Облитерирующий эндартериит в состоянии компенсации и субкомпенсации кровообращения конечностей в период стойкой ремиссии</p>		
64.	I 83	<p>Варикозное расширение вен нижних конечностей</p> <p>Хроническая венозная недостаточность на почве варикозного расширения вен</p>		